

Kaninchenwiese.de

OP-NACHSORGE BEIM KANINCHEN

Was du zuhause tun kannst



Ziel ist es, Schmerzen zu vermeiden, die Wundheilung zu fördern und Komplikationen frühzeitig zu erkennen.



1. WÄRME & RUHE

Nach der OP warm halten

- ✓ Das Kaninchen sollte die Praxis erst verlassen, wenn es aus der Narkose erwacht ist und sich selbstständig auf den Beinen halten kann.
- ✓ Für den Heimweg Wärmflasche oder Snuggle Safe verwenden (mit Handtuch umwickeln).
- ✓ Bei Außenkaninchen bis zur Stabilisierung des Kreislaufs im Haus halten.
- ✓ Ruhigen Bereich bereitstellen.
- ✓ Körpertemperatur kontrollieren, wenn das Tier schlapp wirkt oder kalte Ohren hat (Temperatur sollte über 38,5 °C liegen).



- ✗ Untertemperatur oder starke Teilnahmslosigkeit = Wärmen & Tierarzt kontaktieren.



2. FRESSEN & TRINKEN FÖRDERN

Der Darm muss schnell wieder arbeiten

- ✓ Futter direkt vor die Nase legen.
- ✓ Besonders beliebt: Löwenzahn, Dill, Basilikum, Karottengrün und Wiesenkräuter.
- ✓ Frischfutter immer verfügbar halten.
- ✓ Wasser immer aus einem Napf anbieten, auch Tiere die sonst nicht trinken, brauchen Wasser!
- ✓ Auch das Partnertier kann zum Fressen motivieren.



- ✗ Frisst das Kaninchen mehrere Stunden nach der Heimkehr nicht, muss Rücksprache mit der Praxis erfolgen. Häufig sind Schmerzen oder Untertemperatur die Ursache.



3. SCHMERZEN RICHTIG BEHADELN

Schmerzmittel nicht vergessen

- ✓ Medikamente genau nach Anweisung geben.

Schmerzmittel-Angaben:

_____ x tägl. _____ ml
in den Mund eingeben.

_____ x tägl. _____ ml
in den Mund eingeben.

- ✓ Dosis-Anpassungen immer tierärztlich besprechen.
- ✓ Auf Schmerzzeichen achten: Schmerzen erkennen auf kaninchenwiese.de nachlesen.

- ✗ Schmerzen sind die häufigste Ursache für Fressunlust nach Operationen.



4. WUNDE SCHÜTZEN & KONTROLLIEREN

Die Wunde täglich kontrollieren

Mit Leckerli und Handspiegel lässt sich die Bauchnaht ganz einfach kontrollieren, ohne das Kaninchen anzuheben!


- ✓ Sauber und trocken halten
- ✓ Auf Schwellungen achten
- ✓ Auf Rötungen achten
- ✓ Auf Nässen oder Eiter achten
- ✓ Auf ungewöhnlichen Geruch achten
- ✓ Fäden nicht anknabbern lassen

Geeigneter Schutz:

- ✓ Intrakutannaht
- ✓ Kaninchenbody
- ✓ Pflaster (je nach OP)
- ✓ Krallenschutz wenn sie an der Wunde kratzen
- ✓ Donut nur in Ausnahmefällen

- ✗ Harte Trichter wie bei Hund oder Katze sind ungeeignet.
- ✗ Starke Schwellung, Blutung, Eiter oder eine aufplatzende Wunde sind Notfälle.

Wundkontrolle mit Spiegel



5. GEEIGNETER UNTERGRUND

Die Wunde darf nicht verschmutzen

Geeignet:

- ✓ Trockene Wiese
- ✓ Weiches Heu als Überstreu
- ✓ Sauberer und trockener Untergrund
- ✓ Weiche Unterlagen bei Kaninchen, die diese nicht anfressen

Nur wenn es nicht angeknabbert wird:

- ✓ Handtücher
- ✓ Pipipads
- ✓ Teppiche
- ✓ Wickelunterlagen



Ungeeignet:

- ✗ Hobelspäne
- ✗ Staubige Einstreu
- ✗ Hartes Stroh
- ✗ Hartes Heu
- ✗ Verschmutzter Untergrund



- ⚠ Angeknabberte Stoffe oder Unterlagen können lebensgefährliche Verdauungsprobleme verursachen.



6. BEWEGUNG & HALTUNG

Verletzungen vermeiden

- ✓ Ausreichend Platz zum Laufen, Bewegung fördert Kreislauf und Verdauung.
- ✓ Flache Toilettenschale verwenden.
- ✓ Etagen absperren oder mit Rampen sichern.

Vermeiden:

- ✗ Hohe Sprünge
- ✗ Große Höhenunterschiede
- ✗ Hohe Toiletteneinstiege
- ✗ Etagen



- ⚠ In den ersten Tagen Sprünge über ca. 20 cm vermeiden.



7. PARTNERTIERE NICHT VERGESSEN

Sozialkontakt hilft bei der Heilung

- ✓ Nach Möglichkeit beim Partnertier lassen.
- ✓ Gruppenverhalten beobachten.
- ✓ Harmonische Gruppen nicht trennen.
- ✓ Viele Kaninchen profitieren von ihren Sozialpartnern.



- ⚠ Trennung kann zu Rangordnungskämpfen und Vergesellschaftungsproblemen führen.



8. WANN SOFORT ZUM TIERARZT?

NOTFALLZEICHEN

- ✗ Frisst nicht
- ✗ Kein Kotabsatz
- ✗ Starke Schwellung der Wunde
- ✗ Blutung
- ✗ Eiter oder übler Geruch
- ✗ Atemprobleme
- ✗ Untertemperatur
- ✗ Starke Schmerzen
- ✗ Teilnahmslosigkeit
- ✗ Verschlechterung des Allgemeinzustandes
- ✗ Aufplatzende Naht
- ✗ Starker Geruch aus der Wunde

LÄNGER ANDAUERENDE FRESSUNLUST NACH DER OP IST IMMER EIN WARNSZEICHEN!

⚠ SOFORT HANDELN:

Ein Kaninchen, das mehrere Stunden nach der Heimkehr nicht frisst, muss tierärztlich kontrolliert werden. Untertemperatur und Fressunlust sind die häufigsten Notfälle nach Operationen.



WICHTIG

- ✓ Kaninchen dürfen vor Operationen nicht ausgenüchtert werden.
- ✓ Die häufigsten Ursachen für Komplikationen sind:
 - Schmerzen
 - Untertemperatur
 - mangelnde Futteraufnahme
- ✓ Je früher Probleme erkannt werden, desto besser sind die Heilungschancen.



MEHR INFORMATIONEN

Ausführlicher Ratgeber auf Kaninchenwiese.de
Operationen & Kastrationen beim Kaninchen

24h Notdienst-Nummer: _____



Kaninchenwiese.de